Mögliche Komplikationen

Trotz sorgfältiger Vorgehensweise können nach dem operativen Eingriff Komplikationen auftreten.

- Bei 1 – 2 % der Patientinnen kann in der Gebärmutter restliches Gewebe verbleiben, das durch eine Nachkürettage entfernt werden muss.
- Bei 1 – 2 % der Patientinnen kann sich eine Infektion der Unterleibsorgane entwickeln.
- Direkt beim Eingriff kann es in seltenen Fällen zu einer Verletzung der Gebärmutter mit evtl. stärkerer Blutung kommen, die in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden muss.

Bitte wenden Sie sich an Ihre betreuende Praxis oder direkt an uns, wenn Sie in den Tagen nach dem Eingriff unter folgenden Symptomen leiden:

- starke Blutungen
- Fieber
- starke Unterleibsschmerzen
- riechender himbeerfarbener Ausfluss
- starke Kreislaufbeschwerden
- allgemeines Krankheitsgefühl

Außerhalb der Praxiszeiten erreichen Sie den Allgemeinen Notdienst unter der Nummer: 116 117

GYN KÖ 70 STUTTGART


Dr. med. Nadine Mark
Dr. med. Berit Deiters
Ulrike Piro

Praxis GYN

Königstr. 70, 70173 Stuttgart
gyn-koe70.de
Tel. 0711 - 907 13 907


Terminvereinbarung unter:

0711 – 907 13 907
info@gyn-koe70.de



GYN KÖ 70 STUTTGART

Dr. med. Nadine Mark
Dr. med. Berit Deiters
Ulrike Piro



Ambulante Operationen

Sehr geehrte Patientin,

bei Ihnen ist ein ambulanter operativer Eingriff in Kurznarkose geplant. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Ihr Termin

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Klinik: Anästhesie Praxisklinik

Die Anästhesie-Praxisklinik wird geleitet von Dr. A. Rahmany (Facharzt für Anästhesiologie). Wir führen dort in Zusammenarbeit mit einer Narkoseärztin oder einem Narkosearzt unsere ambulanten operativen Eingriffe durch.

Anästhesie Praxisklinik
Olgastr. 57 a
70182 Stuttgart
Tel. 0711 - 24 24 45
praxisklinik-stgt.de

ANÄSTHESIE PRAXISKLINIK Ambulante Operationen

Parkmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel

- Breuninger Parkhaus
- Parkhaus Leonardstraße
- U-Bahn-Haltestelle Rathaus oder Olgaeck

Was Sie vor dem Eingriff beachten sollten:

Bitte kommen Sie nüchtern, d.h. dass Sie 6 Stunden vor Ihrem Termin nichts mehr essen dürfen. Bis zu 2 Stunden vorher können Sie noch Wasser oder ungesüßten Tee trinken.



Bitte bringen Sie mit

- ggf. Versichertenkarte
- eine leichte Decke für den Aufwachraum
- Zwei Binden und frische Unterwäsche
- _____
- _____

Ca. 1,5 Stunden nach Klinikaufnahme können Sie nach Hause entlassen werden. Bitte lassen Sie sich von jemandem abholen.

Nach einer OP in Narkose dürfen Sie nicht selbst Auto fahren oder ohne Begleitung öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

Was Sie nach dem Eingriff beachten sollten:

- Bitte vereinbaren Sie – wie nach der OP besprochen – sobald wie möglich einen Kontrolltermin bei uns oder bei Ihrer betreuenden gynäkologischen Praxis.
- In den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff sollten Sie nicht alleine sein.
- Eine vaginale, ca. periodenstarke Blutung in abnehmender Stärke bis zu ca. 10 – 14 Tage nach dem Eingriff ist normal.
- Bitte verwenden Sie in den ersten 14 Tagen nach der OP nur Binden, keine Tampons oder Menstruationstassen.
- Bei leichten Unterleibsbeschwerden dürfen Sie Ibuprofen 400 mg Tabletten, Buscopan 10 mg Dragees oder Paracetamol 500 mg Tabletten einnehmen (jeweilige Dosierung laut Packungsbeilage). Die Einnahme von Aspirin wird nicht empfohlen.
- Vermeiden Sie in der ersten Woche nach der Operation heiße Bäder, Sauna, Wärmflasche oder Leistungssport. Die Blutungen können sich dadurch verstärken.
- Achten Sie ggf. auf eine sichere Verhütung mit Kondom bzw. einer anderen Art der Empfängnisverhütung.
- Suchen Sie bei überperiodenstarken Blutungen, Kreislaufbeschwerden, Bauchschmerzen, stark riechendem Ausfluss oder Fieber bitte notfallmäßig einen Arzt auf.